



SIGNES CLINIQUES

- Faiblesse de
 - l'abduction (Jobe) (sus-épineux)
 - la rotation externe (infra-épineux)
 - la rotation interne (sous scapulaire)

ÉPAULE- RUPTURE DE LA COIFFE

**RX simple de l'épaule pour éliminer
autres pathologies osseuses**

CONDITION AIGÛE

CONDITION CHRONIQUE

<50 ANS

>50 ANS

Traitement conservateur (durant 6 mois)

- Analgésie (acetaminophen, AINS)
- Infiltration corticostéroïde sous acromial
- Physiothérapie
- Exercices à domicile

- RÉFÉRENCE RAPIDE (<2mois) en orthopédie
- en attendant la consultation en ortho:

- IRM
- Analgésie
- Physiothérapie

**Si les symptômes sont toujours
incommodants et que le patient accepte la
chirurgie**

IRM

**- © orthopédie au
bureau avec CD et
rapport IRM**

Service de chirurgie orthopédique , Hôpital du Haut Richelieu

Dr. Jon Armano MD FRCS(C)

Dr. Xavier Jodoin Fontaine MD FRCS(C)

Dr. Louis Morazin MD FRCS(C)

Dr. Florent Blanchet MD FRCS(C)

Dr. Nadia Lachance MD FRCS(C)

Dr. Louis David Raymond MD FRCS(C)

Dr. Pierre-Luc Charlebois MD FRCS(C)

Dr. Georges Leclerc MD FRCS(C)

Dr. Hugo Viens MD FRCS(C)

Dr. Mario Corriveau MD FRCS(C)

Dr. Michel Leroux MD FRCS(C)